Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 03/10/2022 - 09/10/2022



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INVAIATURA	36	5	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le condizioni climatiche, caratterizzate da piogge e abbassamento delle temperature, hanno influito sull'aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive. Rileviamo, dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, che le percentuali di infestazione sono ancora in aumento rispetto alla settimana precedente. La soglia d'intervento è stata superata oltre che nelle zone costiere e in campi irrigui anche in tante zone del comprensorio.
Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito in precedenza, consigliamo un trattamento fitosanitario attenendosi al tempo di carenza del prodotto utilizzato in funzione della data di raccolta preventivata. Intervenire tempestivamente con prodotti a base di acetamiprid, fosmet (scorte utilizzabili sino al 1 novembre 2022), upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato.
All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.
Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Città di Salve - Cod. Amm. c_h729 - Prot. n. 0012209 del 04/10/2022 09:36 - ARRIVO

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 03/10/2022 - 09/10/2022



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SALVE
SAN CASSIANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INVAIATURA	25	5	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le condizioni climatiche, caratterizzate da piogge e abbassamento delle temperature, hanno influito sull'aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive. Rileviamo, dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, che le percentuali di infestazione sono ancora in aumento rispetto alla settimana precedente. La soglia d'intervento è stata superata oltre che nelle zone costiere e in campi irrigui anche in tante zone del comprensorio.
Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito in precedenza, consigliamo un trattamento fitosanitario attenendosi al tempo di carenza del prodotto utilizzato in funzione della data di raccolta preventivata. Intervenire tempestivamente con prodotti a base di acetamiprid, fosmet (scorte utilizzabili sino al 1 novembre 2022), upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato.
All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.
Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Città di Salve - Cod. Amm. c_h729 - Prot. n. 0012209 del 04/10/2022 09:36 - ARRIVO

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 03/10/2022 - 09/10/2022



COMPRENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN DONACI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INVAIATURA	29	6	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le condizioni climatiche, caratterizzate da piogge e abbassamento delle temperature, hanno influito sull'aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive. Rileviamo, dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, che le percentuali di infestazione sono ancora in aumento rispetto alla settimana precedente. La soglia d'intervento è stata superata oltre che nelle zone costiere e in campi irrigui anche in tante zone del comprensorio.
Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito in precedenza, consigliamo un trattamento fitosanitario attenendosi al tempo di carenza del prodotto utilizzato in funzione della data di raccolta preventivata. Intervenire tempestivamente con prodotti a base di acetamiprid, fosmet (scorte utilizzabili sino al 1 novembre 2022), upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato.
All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.
Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Città di Salve - Cod. Amm. c_h729 - Prot. n. 0012209 del 04/10/2022 09:36 - ARRIVO

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 03/10/2022 - 09/10/2022



COMPRENSORIO - TA - PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPIANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INVAIATURA	17	5	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le condizioni climatiche, caratterizzate da piogge e abbassamento delle temperature, hanno influito sull'aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive. Rileviamo, dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, che le percentuali di infestazione sono ancora in aumento rispetto alla settimana precedente. La soglia d'intervento è stata superata oltre che nelle zone costiere e in campi irrigui anche in tante zone del comprensorio.
Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito in precedenza, consigliamo un trattamento fitosanitario attenendosi al tempo di carenza del prodotto utilizzato in funzione della data di raccolta preventivata. Intervenire tempestivamente con prodotti a base di acetamiprid, fosmet (scorte utilizzabili sino al 1 novembre 2022), upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato.
All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.
Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Città di Salve - Cod. Amm. c_h729 - Prot. n. 0012209 del 04/10/2022 09:36 - ARRIVO

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI **Tignola dell'olivo** *(Prays oleae)*	Soglia di intervento *(solo per la generazione carpofaga)* · **Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine.** · **Per le olive da tavola: 5 - 7 %** **Interventi chimici:** ***solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa*** Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con le trappole a feromone e comunque prima dell'indurimento del nocciolo al superamento della soglia di intervento	Fosmet		2	*Fosmet impiegabile fino al 1/11/2022
		Bacillus thuringiensis			
		Acetamiprid		2	
		Spinetoram	1	2	
Mosca delle olive ***(Bactrocera oleae)***	**Soglia di intervento** **Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture** **Per le olive da olio: in funzione delle varietà 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve)**	*Opius concolor*	(*)		(*) lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica
		Beauveria bassiana			
	Interventi chimici Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - preventivi (adulticidi): **esclusivamente** utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale - curativi (nei confronti delle larve): al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).	Cattura massale			
		Sistemi tipo attract and kill		(*)	**(*) per interventi preventivi adulticidi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento**
		Fosmet		2*	**(*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento**
		Acetamiprid		2*	**(*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento**
Oziorrinco *(Otiorrhynchus cribricollis)*	**Interventi agronomici** Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti. Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto (maggio - giugno e settembre - ottobre).				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Città di Galatina - Cod. Ammin. C_F712 - Reg. Ufficiale U. 0012209 del 04/10/2022 09:30 - ARRIVO